



## **Orientações para Biópsia guiada por tomografia ou Ultrassonografia**

- Jejum de 6 horas
- Suspender anticoagulantes como Apixabana (Eliquis), Rivaroxabana (Xarelto, Rivaxa etc), Dabigatрана (Pradaxa), Edoxabana (Lixiana) 2 dias antes do procedimento. Suspender anticoagulante Marevan 5 dias antes do procedimento. No caso de risco de trombose elevado sem as referidas medicações o médico assistente deverá prescrever de Clexane no lugar, e suspender dose da noite anterior do exame (24 horas sem a medicação).
- Suspender antiplaquetário 5 dias antes (Clopidogrel e/ou Plavix, Ticlopidina)
- Trazer sempre os exames Rx e Tomografia (tórax).
- Não utilizar insulina ou anti-diabéticos na manhã do exame. Voltar utilizar após o exame.
- Poderão utilizar medicações para hipertensão (pressão alta), bombinhas para doenças respiratórias normalmente.
- Trazer exames de coagulação (coagulograma/INR) e plaquetas.
- No exame poderá ser coletada biópsia (fragmento) de pulmão, com indicação de acordo com cada caso e orientado pelo médico que acompanha o caso. No exame não será realizado a análise do material, sendo este um procedimento em separado.
- Trazer sempre um acompanhante (obrigatório).
- Assinar termo de consentimento informado.

**Clínica MediVale**

Praça da Bandeira, 28 - Centro, Juazeiro



(87) 98824-0490



(74) 3612-9274