Urografia adulto

No dia anterior ao exame:
Durante todo o dia anterior ao exame evitar comer e ou beber derivados do leite (iogurte, queijos, manteiga), não beber sucos ácidos(laranja, abacaxi, limão, caju, uva, entre outros) ou refrigerantes.Às 17:00 horas, fazer uma refeição leve com chá e torradas ou sopa.
Tomar 20 gotas de Simeticona de 2 em 2 horas, das 14 às 22:00 horas. E tomar 4às 20:00 horas. **Atenção:** se o Bisacodil não fizer efeito até a meia noite, tome mais 4 comprimidos.
No dia do exame: O paciente deverá trazer os exames de Uréia e creatinina.
Jejum de 6 horas, exceto água e medicações de uso diário. 1 hora antes do exame, tomar 60 gotas de Simeticona.
Importante: Traga um acompanhante e chegue com antecedência.
Se história de alergia anterior ao contraste, fazer também o preparo antialérgico.

Urografia criança

No dia anterior ao exame:

Durante todo o dia anterior ao exame evitar comer e ou beber derivados do leite (iogurte, queijos, manteiga), não beber sucos ácidos(laranja, abacaxi, limão, caju, uva, entre outros) ou refrigerantes.Às 17:00 horas, fazer uma refeição leve com chá e torradas ou sopa
Tomar 10 gotas de Simeticona de 2 em 2 horas, das 14 às 22:00 horas.Às 18:00 horas,tomar 02 comprimidos de Bisacodil.. **Atenção:** se o Bisacodil não fizer efeito até a meia noite, tome mais 2 comprimidos.
No dia do exame: O paciente deverá trazer o exame de Uréia e creatinina.
Tomar 25 gotas de Simeticona às 06 horas da manhã.
No dia do exame jejum de 6 horas.
Traga seus exames anteriores relacionados à este novo exame.
Importante: Obrigatório um acompanhante e chegue com antecedência.
Observação:
Se história de alergia anterior ao contraste, fazer também o preparo antialérgico.